



PREPARACION PARA CIRUGIA DE COLON (Moviprep)

- Para reducir el riesgo de sangrado:
 - Si está tomando Plavix (clopidogrel), deje de tomar el medicamento 14 días antes de su colonoscopia.
 - Deje de tomar medicamentos que contengan aspirina (ASA) 7 días antes de su procedimiento (alka-seltzer, anacin, ascriptin, ecotrin, empirin, exedrin, haflprin).
 - Deje de tomar ante-inflamatorios 2 días antes del procedimiento (advil, aleve, anaprox, daypro, diclofenac, etodolac, ibuprofen, inodacid, ketoprofen, ketrorolac, lodine, motrin, naprosyn, nuprin, relafen, torodol, voltaren).
- Si requiere de medicamento para el dolor, utilice Tylenol (acetaminophen).
- Es necesario que su colon esté limpio antes de su cirugía:
 - La mañana antes de su procedimiento empiece con una dieta de líquidos claros. Esto incluye:
 - Caldos o consomés claros
 - Gelatina o helados de agua (paletas heladas)
 - Dulces duros
 - Gatorade o refrescos
 - Café o te
 - Jugos sin pulpa
 - Jugos sin pulpa
 - No consuma alimentos sólidos, con excepción de dulces duros o helados de agua.
 - No consuma productos lácteos como queso, nieve (helados), yogurt.
 - Deje de tomar laxantes que contengan fibra (metamucil, citrucel, konsyll fibercon, bran effersylium).
 - Deje de tomar vitaminas que contengan hierro (geritol, etc.).
- Debe de recibir una receta para MoviPrep:
 - Empezanda a las 4 p.m. el día antes de su cirugía.
 - Mezcle el MoviPrep (llene el recipiente con agua y agítelo hasta que se disuelva el polvo) y mete lo en la refri por una hora.
 - A las 5 p.m. empiece a tomarse la solución sobre una hora.
 - A las 7 p.m. prepare el segundo litro.
 - A las 8 p.m. empiece a tomarse la solución sobre una contenido.
- Después de que se tome el laxante, recomendamos que consuma todos los líquidos claros que desee, pero solo hasta la medianoche.
- Puede aplicarse “Tucks ointment” o vaselina sobre el ano en caso de que sienta dolor
- No consuma nada (alimentos o bebidas) después de medianoche, la noche antes de su cirugía. Debe tomarse sus medicamentos para la presión o para el corazón por la mañana con un poquito de agua. Si es diabético, cheque su nivel de glucosa por la noche y la mañana antes de su procedimiento. Si su glucosa se encuentra baja, tome un poco de jugo sin pulpa. No utilice insulina o medicamento para la diabetes hasta después de su cirugía.
- Repórtese a la oficina de admisiones del hospital _____ a las _____ del día _____.